УДК 551.24:553.982

DOI 10.47148/0016-7894-2024-2-5-18

Тектоника Бузачинской зоны нефтегазонакопления на западе Туранской плиты

© 2024 г. | В.И. Попков, И.В. Попков

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет», Краснодар, Россия; geoskubsu@mail.ru; iv-popkov@mail.ru

Поступила 11.12.2023 г.

Доработана 22.01.2024 г.

Принята к печати 30.01.2024 г.

Ключевые слова: *антиклинали; надвиги; тангенциальное сжатие; ловушки нефти и газа.*

Аннотация: В последние годы появляется все больше свидетельств наличия в чехле платформ дислокаций, образовавшихся под воздействием сил бокового сжатия. Одним из таких районов является Бузачинский свод, располагающийся в западной части Туранской плиты. Проведенные исследования показали, что локальные поднятия платформенного чехла, содержащие в ряде случаев крупные скопления углеводородов, сформированы в обстановке периодически проявлявшегося тангенциального сжатия. В плане они совпадают с фронтальными частями тектонических чешуй и пологих надвигов в триас-палеозойском комплексе пород, претерпевших интенсивную складчатость в предъюрское время. Детально описана морфология дислокаций и история их развития. Установленные закономерности строения и площадного распространения дислокаций позволили решить практические задачи, касающиеся условий формирования скоплений нефти и газа, направлений миграции и вероятных зон генерации углеводородов. Полученные результаты могут быть использованы при определении дальнейших направлений геолого-разведочных работ в регионе.

Для цитирования: Попков В.И., Попков И.В. Тектоника Бузачинской зоны нефтегазонакопления на западе Туранской плиты // Геология нефти и газа. – 2024. – № 2. – С. 5–18. DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-5-18.

Финансирование: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда №23-27-00037.

Tectonics of Buzachinsky zone of oil and gas accumulation in Turansky Plate western part

© 2024 | V.I. Popkov, I.V. Popkov

Kuban State University, Krasnodar, Russia; geoskubsu@mail.ru; iv-popkov@mail.ru

Received 11.12.2023

Revised 22.01.2024

Accepted for publication 30.01.2024

Key words: *anticline; thrust; tangential compression; oil and gas trap.*

Abstract: Over the last years, evidences increasingly point to the fact that there are dislocations in the platform sedimentary covers, which were formed under lateral compression. The Buzachinsky arch situated in the western part of the Turansky Plate is one of these areas. The investigations showed that local uplifts of platform sedimentary cover sometimes containing large hydrocarbon accumulations were formed under the repeated tangential compression. In plan view, they coincide with the frontal parts of fault slices and low-angle thrusts in Triassic-Palaeozoic sequence, which were subject to intensive folding in pre-Jurassic time. The authors describe in detail the morphology of dislocations and their evolution history. The revealed structural patterns and common factors of areal distribution of dislocations allowed solving practical problems related to the formation settings of oil and gas accumulations, directions of migration, and possible zones of hydrocarbon generation. The results obtained can be used to determine further exploration and prospecting trends in the region.

For citation: Popkov V.I., Popkov I.V. Tectonics of Buzachinsky zone of oil and gas accumulation in Turansky Plate western part. *Geologiya nefiti i gaza*. 2024;(2):5–18. DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-5-18. In Russ.

Funding: These studies are supported by the Russian Science Foundation, grant No. 23-27-00037.

Введение

Бузачинская зона нефтегазонакопления приурочена к одноименному своду, располагающемуся на одноименном полуострове, где происходит сочленение крупных тектонических элементов: Северо-Устюртского докембрийского массива, Центрально-Мангышлакской раннекеммерийской складчатой зоны эпигерцинской Туранской плиты и Прикаспийской синеклизы древней Восточно-Европейской платформы (рис. 1).

Глубинное строение региона, местоположение границ и характер сочленения этих разновозрастных структур были подробно рассмотрены в предшествующих работах [1–4]. Бузачинский свод, выделяемый в отложениях платформенного чехла, представляет собой наложенную структуру по отношению к более древним комплексам.

Платформенные отложения, в которых открыты крупные скопления нефти и газа, имеют высокую степень геолого-геофизической изученности.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 1. Тектоническая карта Каспийского региона (по данным [5] с изменениями и дополнениями)

Fig. 1. Tectonic map of Caspian region, modified and supplemented after [5]

Усл. обозначения к рис. 1

Legend for Fig. 1

МК — складчатая система Малого Кавказа, НА — Нижне-Араксинский прогиб, ТЗ — Талышская зона, ЭГ — Эльбурско-Горганский передовой прогиб, ЗТ — Западно-Туркменский прогиб, ГО — Гограндаг-Окаремская зона

1 — study areas; **basement of platform areas (2–5):** **2** — Early Precambrian (a — land, b — sea), **3** — Baikalian, **4** — Hercynian (a — land, b — sea), **5** — early Cimmerian (a — land, b — sea); **Alpine fold-and-nappe systems (6, 7):** **6** — Greater Caucasus and Kopet Dag (a — land, b — sea), **7** — Lesser Caucasus, Talysh Mountains, Alborz; **8** — foredeeps, troughs, and depressions (a — land, b — sea); **9** — depressions underlain by oceanic crust; **10** — faults at boundaries between large structures; **11** — other large faults.

Tectonic structures: БС — Buzachi Arch, МУ — Mangyshlak — Central Ustyurt Zone, ЮМ — South Mangyshlak — Ustyurt trough system, ТЗ — Tuarkyr Zone, СК — Middle Caspian — Kara-Bogaz antecline, ВМ — East Manych trough, ПС — Near-Kuma uplift system, НС — Nogai structural scarp, БК — Greater Caucasus fold system, КД — Kusary-Divichi trough, АП — Apsheron — Near Balkhan Zone, ЗК — West Kopet Dag Zone, МК — Lesser Caucasus fold system, НА — Lower Aras trough, ТЗ — Talysh Zone, ЭГ — Alborz — Gorgan foredeep, ЗТ — West Turkmenian trough, ГО — Gograndag — Okarem Zone

Продуктивность связана с отложениями среднеюрского и раннемелового возраста, в которых открыты месторождения Каражанбас, Северные Бузачи, Каламкас, Северный Каражанбас, Каратурун, Жалгизтобе, Каратурун Морской, Арман, Каратурун Восточный. Глубина обнаружения залежей УВ составляет от 220 до 1000 м. Принадлежат они к зоне нефтегазонакопления кряжа Карпинского [6] (рис. 2).

Нефти, независимо от глубины залегания месторождения, высокосмолистые (18–30 %), тяжелые (0,9–0,91 т/м³), сернистые (до 2 %), недонасыщены газом и имеют низкую температуру застывания. По характеру насыщающего флюида месторождения относятся к нефтяным и газонефтяным. В северном направлении по мере погружения продуктивных горизонтов в меловом разрезе появляются газовые залежи, а в верхних горизонтах юры — небольшие газовые шапки (месторождения Каламкас, Арман), снижается плотность — нефти от 0,9410–0,9446 г/см³ на месторождении Каражанбас до 0,9006–0,9221 г/см³ на месторождении Каламкас. Вниз по разрезу, как правило, уменьшаются размеры залежей, их высота и коэффициент заполнения ловушек по соответствующему горизонту.

Месторождения Бузачинского свода находятся в северной и центральной его частях, локализованы в антиклинальных складках субширотного простирания, в той или иной степени осложненных разрывами, в том числе высокоамплитудными. В южных районах свода, несмотря на значительный объем глубокого бурения, аналогичные структурные элементы оказались пустыми.

Гораздо меньше сведений имеется о структуре подстилающих триасовых и палеозойских отложе-

Рис. 2. Схема нефтегазоносных провинций и областей Каспийского региона (по данным [6] с изменениями)
 Fig. 2. Scheme of petroleum provinces and areas of the Caspian region (modified from [6])

ний. Сейсморазведка разных лет зафиксировала сложную волновую картину с отсутствием регионально-выдержанных ОГ в доюрском разрезе, что является следствием высокой дислоцированности

доплитных комплексов [7]. Несмотря на то, что триасовые и палеозойские отложения вскрыты многими скважинами, залежей нефти и газа в них не обнаружено.

FORMATION AND LOCATION OF OIL AND GAS POOLS

Рис. 3. Тектоническая схема п-ова Бузачи

Fig. 3. Tectonic framework of Buzachi peninsula

1 — границы Бузачинского свода; **2** — надвижки; **3** — сдвиги; **4** — платформенные антиклинали: **1** — Арман, **2** — Каламакас, **3** — Каратурун-море, **4** — Суюкты, **5** — Каратурун, **6** — Култай, **7** — Бузачи-море, **8** — Каражанбас-море, **9** — Каражанбас, **10** — Жалгизтобе, **11** — Северные Бузачи, **12** — Жаманорпа, **13** — Северная Бесоба, **14** — Акорпа, **15** — Жалзак, **16** — Жапалак, **17** — Бесоба, **18** — Киньткты, **19** — Жарылгас, **20** — Айсор, **21** — Северный Кызан, **22** — Северный Тасбас, **23** — Западный Тасбас, **24** — Тасбас, **25** — Долгинец, **26** — Северный Долгинец, **27** — Алатобе, **28** — Западный Кызан, **29** — Кызан-Акшимрау, **30** — Торлун-море, **31** — Западный Торлун, **32** — Торлун, **33** — Акмола, **34** — Кошак; **5** — линия сейсмического разреза

1 — boundaries of Buzachinsky arch; **2** — thrusts; **3** — strike-slip faults; **4** — platform anticlines (**1** — Arman, **2** — Kalamaks, **3** — Karaturun-sea, **4** — Suyukty, **5** — Karaturun, **6** — Kultai, **7** — Buzachi-sea, **8** — Karazhanbas-sea, **9** — Karazhanbas, **10** — Zhalgiztobe, **11** — North Buzachi, **12** — Zhamanorpa, **13** — North Besoba, **14** — Akorpa, **15** — Zhalzak, **16** — Zhapalak, **17** — Besoba, **18** — Kinytkty, **19** — Zharylgas, **20** — Aisor, **21** — North Kyzan, **22** — North Tasbas, **23** — West Tasbas, **24** — Tasbas, **25** — Dolginets, **26** — North Dolginets, **27** — Alatoobe, **28** — West Kyzan, **29** — Kyzan-Akshimrau, **30** — Torlun-sea, **31** — West Torlun, **32** — Torlun, **33** — Akmola, **34** — Koshak); **5** — line of seismic section

Целью данной работы было изучение тектонического строения юрско-палеогеновых отложений, слагающих платформенный чехол, а также подстилающих верхнепалеозой-триасовых толщ, морфологии и условий образования развитых в них складчатых и разрывных дислокаций. Основываясь на полученных результатах, предпринята попытка определить роль тектонического фактора в формировании скоплений нефти и газа в пределах Бузачинского свода, объяснить закономерности их пространственного распространения и, тем самым, решить некоторые нефтегеологические вопросы.

В основу исследований положены материалы глубокого и структурно-картировочного бурения, геологической съемки, сейсморазведки, данные о строении месторождений, геохимии нефти и рассеянного ОВ. Выполнены необходимые структурные и палеотектонические построения.

Результаты исследований

Основные структуры платформенного чехла п-ова Бузачи — одноименный свод и располагающийся южнее Южно-Бузачинский прогиб. Осложняющие их локальные поднятия сгруппированы в

несколько субширотных антиклинальных линий, примыкающих с юга к надвигам (рис. 3). Рассмотрим более подробно особенности строения дислокаций на примере наиболее изученных структур.

Локальное поднятие Каражанбас (см. рис. 3) представляет собой полуантиклиналь, примыкающую с юга к крупному разрывному нарушению, которое рассекает центральную часть Бузачинского свода. Надвиг выгнут к северо-северо-востоку. Ядро складки сложено нижнеальбскими породами и обрамлено среднеальбскими отложениями. В своде юрские отложения полностью уничтожены эрозией в преднеокомское время, а мощность меловых образований значительно сокращена. В лежащем блоке скачкообразно увеличиваются мощность и стратиграфическая полнота разреза (рис. 4, 5). Подобная ситуация имеет место и на всех других структурах.

По подошве юры размеры складки 28×6 км, амплитуда 200 м, вертикальное смещение по контролируемому надвигу достигает 300 м. Вверх по разрезу амплитуда смещения уменьшается, составляя по подошве неокомских отложений 160 м, аптских 120 м, альбских 100 м.

Рис. 4. Структурная карта по подошве юрских отложений (антиклинали Каражанбас и Северные Бузачи)
Fig. 4. Depth map over the Jurassic Bottom covering (Karazhanbas and North Buzachi anticlines)

Рис. 5. Сейсмический временной (А, В) и сейсмогеологический (С) разрезы через антиклиналь Каражанбас
Fig. 5. Seismic time section (A, B) and geoseismic section (C) across Karazhanbas anticline

Часть южного крыла поднятия Каражанбас взброшена относительно северной, вертикальная составляющая амплитуды смещения по подошве юрских отложений 50–60 м. Тектонические нарушения разрывают консолидированные отложения юры и мела и погребены под рыхлыми четвертичными осадками. Поверхности надвигов наклонены к югу и заметно выполаживаются в доюрской части разреза (см. рис. 5).

Свод поднятия рассечен еще несколькими малоамплитудными разрывами, не доходящими, однако, до дневной поверхности. Отложения пермотриаса во фронтальной части надвига интенсивно перемяты, брекчированы. В керне часто встречаются субгоризонтальные зеркала скольжения.

Несмотря на очевидное наклонное падение разрывов как на данной площади, так и на многих других поднятиях п-ова Бузачи достоверно установить их пересечение скважинами очень трудно. Причиной этому является: континентальный генезис юрских и триасовых отложений и невыразительная электрокаротажная характеристика разреза, фрагментарность выноса керна, а для доюрской части разреза положение усугубляется еще и высокой дислоцированностью пород.

Северо-восточнее расположена асимметричная принадвиговая антиклиналь Северные Бузачи (см. рис. 3). Размер ее 20 × 6 км, амплитуда поднятия по подошве юрских отложений 150 м. В рельефе дневной поверхности в своде поднятия сформирована эрозионная депрессия, заполненная четвертичными осадками мощностью 35–40 м. Под ними залегают нижнеальбские породы с последовательным появлением на крыльях складки средне-верхнеальбских отложений.

Южнее антиклинали Северные Бузачи расположено поднятие Жалгизтобе (см. рис. 4), прилегающее к фронту надвига. Размеры складки 16 × 3 км, амплитуда по подошве юры 100 м. Южное ее крыло осложнено встречным надвигом, поверхность которого наклонена на север (рис. 6).

В центре Бузачинского свода находится крупная (40 × 10 км, амплитуда 800 м) антиклиналь Жаманорпа (см. рис. 3). Северное крыло очень короткое, оборвано надвигом с амплитудой по подошве юрских отложений 800 м, южное — более широкое и пологое с углами падения слоев 3–5° (рис. 7).

Юрские отложения в своде поднятия были практически уничтожены преднеокомским размывом, но к северу от надвига эти отложения значительной мощности неравномерно появляются в разрезе (рис. 8). Сокращена в своде и мощность меловых отложений, залегающих под рыхлыми четвертичными супесями и суглинками. В ядре складки находятся породы альбского возраста, обрамленные по периферии отложениями сеномана и сенона — турона.

Угол наклона фронтального надвига в платформенных отложениях составляет 75–80°, в то

время как в доюрской части разреза происходит его резкое выполаживание с переходом в субгоризонтальный срыв. Поверхность надвига вскрыта скв. 12: под 700-м толщей пестроцветных алевролитов и аргиллитов нижнего — среднего триаса залегают сероцветные отложения среднего — верхнего триаса мощностью 940 м. Ниже вновь обнаруживаются пестроцветные отложения, аналогичные вскрытым в верхней части разреза [2]. Отложения триаса дислоцированы. Углы падения слоев, замеренные в керне, изменяются от 5° до вертикальных, максимальные значения приходятся на среднюю толщу.

Следствием высокой дислоцированности отложений пермотриаса во фронтальной части тектонической пластины является отсутствие на сейсмических разрезах этого участка даже непротяженных ОГ.

На южное пологое крыло антиклинали Жаманорпа взброшена северная часть северо-бесобинской складки.

В северной части Бузачинского свода располагается антиклинальная зона Каламкас (рис. 9). На более крупной (33 × 6 км, амплитуда 250 м) здесь является одноименная складка (см. рис. 3). Как и у всех предыдущих структур, более пологим является южное крыло, а северное оборвано надвигом, но верхний стратиграфический диапазон его проникновения ограничивается юрскими отложениями (рис. 10, северная часть). Структура разбита сдвигами северо-восточной ориентации.

В состав антиклинали Каламкас входят также поднятия Арман, Каратурун-море и Суюкты.

Как показал анализ материалов высокоточной аэромагнитной съемки [1], граница Северо-Устьюртского докембрийского массива и Прикаспийской впадины на данном участке проходит непосредственно под антиклинальной зоной Каламкас. Приведенные выше сведения указывают на надвиговый характер границы этих крупных тектонических элементов, как и в зоне сочленения с кряжем Карпинского и его морским продолжением [1, 8–10].

Близкое строение имеют дислокации Южно-Бузачинского прогиба. Важно отметить, что в его пределах имеются и другого рода доказательства горизонтальных перемещений, в частности тектонического сближения разнофациальных отложений триаса. Так, в скв. Западный Торлун-1 в интервале глубин 1448–2046 м вскрыт морской сероцветный карбонатно-терригенный комплекс среднего триаса центрально-мангышлакского типа, надвинутый на однообразные континентальные и прибрежно-морские пестроцветные образования, характерные для разрезов Бузачинского свода. Кроме того, в интервале 2043–2046 м обнаружен пласт тектонической брекчии, состоящей из щебневидных, реже округло-угловатых обломков глинистых пород как сероцветной толщи (отложения аллохтона), так и подстилающих пестроцветных отложений триаса.

Рис. 6. Антиклиналь Жалгизтобе
Fig. 6. Zhalgiztobe anticline

Обсуждение результатов структурного анализа

Изучение платформенных антиклиналей п-ова Бузачи позволило установить ряд закономерностей не только их морфологии, но и площадного размещения. Антиклинальные поднятия имеют линейную или брахиантиклинальную формы. Северные их крылья короткие, более крутые, чем южные, оборваны высокоамплитудными надвигами с углами наклона сместителей 45–80°. С глубиной происходит быстрое выполаживание поверхностей разрывов с переходом в субгоризонтальное положение с образованием серии тектонических чешуй и пластин. Отложения пермотриаса во фронтальных их частях интенсивно дислоцированы, образуя линейные складчатые системы, в перекрывающем платформенном чехле им отвечают асимметричные антиклинали.

Особенности строения и закономерности площадного распространения складчато-надвиговых дислокаций со всей очевидностью указывают на их формирование в обстановке латерального сжатия, ориентированного в северном направлении. Время образования дислокаций связано с концом триасового периода — моментом становления Центрально-Мангышлакской раннекимерийской складчатой зоны [7], северная граница которой трассируется по линии Каражанбас – Жаманорпа – Кызан. Мощная алевролитов-аргиллитовая толща пермотриаса, обладавшая достаточно высокой пластичностью, расслоена на ряд тектонических пластин и сорвана по поверхности более жестких терригенно-кар-

Рис. 7. Структурная карта по подошве юрских отложений (антиклиналь Жаманорпа)
Fig. 7. Depth map over the Jurassic Bottom covering (Zhamanorpa anticline)

Рис. 8. Сейсмический временной (А, В) и сейсмогеологический (С) разрезы через антиклиналь Жаманорпа

Fig. 8. Seismic time section (A, B) and geoseismic section (C) across Zhamanorpa anticline

бонатных каменноугольно-нижнепермских пород, имеющих по данным сейсморазведки свой, отличный от вышележащих комплексов, структурный план, и шарьирована на разновозрастные образования Северо-Устюртского докембрийского массива, послужившие своеобразным блоком-упором.

Основная концентрация тангенциальных напряжений приурочена к фронтальным участкам тектонических пластин, где происходила трансформация горизонтальных смещений в вертикальные, что привело к интенсивным деформациям отложений пермотриаса и образованию листрических надвигов. Следствием этих процессов является и повышенная плотность пород ($2,6-2,7 \text{ г/см}^3$), близкая плотности пород разновозрастного каратауского комплекса Горного Мангышлака ($2,65-2,75 \text{ г/см}^3$).

С внешней стороны Каражанбас-Жаманорпинско-Кызанской структурной зоны проявление сил бокового сжатия заметно ослабевает, но и здесь можно видеть отражение латерального стресса в структуре осадочного чехла. Примером может служить антиклинальная зона Каламкас, расположенная на 40 км севернее. Горизонтальные подвижки периодически возобновлялись и на платформенном этапе, но в меньшем масштабе, что привело к развитию в чехле платформы описанных выше дислокаций.

В результате образовалась эшелонированная система складчато-надвиговых дислокаций субширотной ориентации, гребень каждой из которых погружается в южном направлении в сторону Южно-Бузачинского прогиба. При этом фронтальная часть каждой из более южных линий является взброшенной по отношению к соседней северной с вертикальной амплитудой смещения до 300 м (см. рис. 10).

Детальный палеотектонический анализ свидетельствует о том, что платформенные складчато-надвиговые дислокации развивались в обстановке периодически повторяющегося горизонтального сжатия. Основные моменты возобновления подвижек по надвигам приходятся на преднеокомское, преддатское и предпалеоценовое время, когда территория поднималась выше уровня моря, что сопровождалось размывом накопившихся ранее отложений. Наиболее масштабно размыв проявлялся в сводах растущих антиклиналей.

Один из наиболее значительных перерывов в осадконакоплении на западе Туранской плиты приходится на предсреднемиоценовое время. Отсутствие на большей части п-ова Бузачи нижнемиоценовых и перекрывающих их отложений не позволяет дать обоснованную оценку важности этих движений в формировании структур горизонтального сжатия в его пределах. Однако, учитывая их региональную природу, можно предположить проявление складкообразовательных движений и в пределах рассматриваемого региона. Отражение большинства фронтальных поднятий в современном ландшафте подтверждает их современную активность.

Многие из рассмотренных структур содержат крупные скопления УВ, в том числе высоковязкой нефти, локализованные в юрско-меловых отложениях. И несмотря на крайне неблагоприятные условия для их сохранности (малые глубины залегания, отсутствие надежных покровов, выход разрывов на дневную поверхность) полного разрушения залежей не произошло. Это говорит о том, что надвиги являются слабыми проводниками флюидов, играя в основном роль экранов. Подтверждается это и особенностями строения месторождений, где многие залежи являются тектонически экранированными.

Таким образом, морфологические особенности платформенных антиклиналей п-ова Бузачи, приу-

Рис. 9. Структурная карта по подошве юрских отложений (антиклинальная зона Каламкас)
Fig. 9. Depth map over the Jurassic Bottom covering (Kalamkas anticline zone)

Усл. обозначения см. на рис. 4
 For the Legend see Fig. 4

Рис. 10. Сейсмический временной (А, В) и сейсмогеологический (С) разрезы, иллюстрирующие принадлежность природы бузачинских антиклиналей
Fig. 10. Seismic time section (A, B) and geoseismic section (C) showing the near-thrust origin of the Buzachinsky anticlines

Усл. обозначения см. на рис. 5, местоположение линии разреза на рис. 3
 For the Legend see Fig. 5; location of the section line is in Fig. 3

роченность к фронтальным частям надвигов свидетельствуют об их генетической взаимосвязи и формировании в обстановке тангенциального сжатия. При этом на первом этапе происходит тектоническое расслоение осадочного чехла с образованием пологих срывов и литопластин. Трансформация горизонтальных перемещений пород в вертикальные в лобовых частях последних ведет к образованию листрических разломов — крутых в верхней части разреза и пологих на глубине. В условиях возрастающего бокового сжатия могут формироваться мощные зоны принадвигового смятия.

Условия формирования и перспективы открытия новых скоплений УВ

Анализ истории геологического развития Бузачинского региона свидетельствует о том, что юрско-меловые отложения в силу их малой глубины залегания никогда не находились в термобарических условиях, отвечающих главной зоне нефтегазообразования [11]. Соответственно, выявленные в них скопления нефти и газа эпигенетичны вмещающим отложениям. Детальные геохимические исследования [12] указывают на то, что бузачинская нефть является производной от ОВ морского типа, претерпевшей потерю легких фракций и окисление. Следовательно, она могла быть сгенерирована либо одновозрастными отложениями смежных депрессий, либо поступила из более глубокозалегающих комплексов пород, или же за счет обоих источников. Однако юрские продуктивные отложения преимущественно континентального генезиса, отличающиеся к тому же большой литолого-фациальной изменчивостью, вряд ли могли быть источником столь значительных по запасам уже разведанных месторождений п-ова Бузачи. Подстилающие отложения триаса и палеозоя и содержащееся в них ОВ претерпели существенные постседиментационные преобразования, достигающие стадий глубокого метагенеза — верхнего апокатагенеза [13], были дислоцированы и подверглись глубокому размыву в предъюрское время. Соответственно, если они и генерировали УВ, то их скопления должны были быть разрушены еще до накопления юрско-меловых отложений. В связи с этим можно полагать, что скопления нефти и газа в платформенном чехле, а также отдельные слабые нефтегазопроявления в доюрском разрезе [11, 14] носят вторичный характер.

Микроскопическое изучение палеозойского кернового материала скв. Северные Бузачи-Г-7 показало [15], что во всех исследованных образцах присутствуют следы миграции вторичных флюидов. В трещинах ранней генерации и стилолитах находится окисленный метаморфизованный флюид черного цвета со следами ореолов рассеивания в прилегающих участках породы. В более поздних трещинах присутствует высокоподвижный флюид УВ-состава, свободно мигрирующий в пределах шлифа по трещинам и открывшимся при шлифовке порам. Распределение его в породах неравномерное

и соответствует емкостным возможностям каждого конкретного участка. Основная масса сосредоточена в трещинах поздней генерации, что свидетельствует о недавней миграции УВ через эти породы.

Обнаружение в юрско-меловых нефтях Бузачинского свода палеозойских спорово-пыльцевых комплексов при отсутствии таковых во вмещающих нефть породах [16, 17] указывает на то, что они могли быть захвачены УВ-флюидами в процессе миграции из палеозойских отложений.

Заслуживают внимания результаты специальных геохимических исследований нефтей, выполненных в свое время В.И. Кордус (1976), они показали, что нефти Мангышлака и Северного Устюрта, с одной стороны, и Бузачинского свода — с другой, имеют различный генезис. При этом установлено, что нефти последнего идентичны по УВ-составу нефтям юга Прикаспийской впадины.

В предыдущих работах [11, 18] авторами статьи было высказано мнение, поддержанное позже и другими исследователями [14, 19, 20], что бузачинская нефть имеет тот же источник, что и нефти Прикаспия. Учитывая тектоническую позицию Бузачинского свода, можно допустить формирование его месторождений в результате латерально-ступенчатой миграции УВ в южном направлении из более глубокозалегающих толщ Прикаспийской синеклизы в южном направлении. Такой механизм более реален, если учесть покровно-надвиговый характер сочленения этих гетерогенных структур [1, 2]. Далекой латеральной миграции УВ на юг препятствовали многочисленные надвиги с южным падением сместителей и приуроченные к их фронтальным частям мощные зоны смятия пермотриасового комплекса. Все это могло стать причиной заполнения УВ прежде всего северных дислокаций свода и удовлетворительно объясняет отсутствие скоплений нефти и газа в более южных его районах.

В пределах п-ова Бузачи известно большое число небольших грязевых вулканов, сопков, сальз [21], приуроченных, как показывают исследования авторов статьи, к сдвигам, осложняющим фронтальные складки. Вполне вероятно, что в условиях горизонтального сжатия перемещающиеся в разрезе флюиды используют их в качестве каналов миграции. Подтверждается это и известными случаями повышения температур, газонасыщенности нефтей при одновременном уменьшении их вязкости в скважинах, попадающих в зоны сдвигов, а также данными геохимических исследований скважинных материалов, фиксирующими УВ-аномалии в приповерхностных горизонтах [11].

Переходя к рассмотрению перспектив обнаружения новых скоплений нефти и газа в пределах Бузачинской зоны нефтегазоаккумуляции, отметим, что вероятность открытия существенных по запасам залежей в хорошо изученном платформенном чехле крайне низка. Очевидно, что в нем могут быть обнаружены незначительные по запасам скопления

в неантиклинальных ловушках, прежде всего в прибрежно-морских и континентальных юрских отложениях. Исключением может стать относительно слабо исследованная прилегающая с севера к п-ову Бузачи зона предельного мелководья с глубинами моря до 2 м. Здесь же могут быть продуктивны не только юрско-меловые, но и более древние отложения [18, 14, 22]. Детальный литологический анализ довершнепермских отложений, вскрытых глубокими скважинами на севере п-ова Бузачи, указывает на присутствие в разрезе биоморфных известняков, содержащих многочисленные остатки рифостроющих организмов, а также грубообломочных отложений предрифовых шлейфов [23]. По аналогии со смежными районами Прикаспийской впадины [24] здесь можно ожидать обнаружение биогермных построек, содержащих скопления нефти и газа. Несомненно эта зона может в перспективе стать важным объектом для постановки детальных сейсморазведочных работ с последующим бурением глубоких скважин.

Выводы

Локальные поднятия платформенного чехла Бузачинской зоны нефтегазонакопления, содержащие в ряде случаев крупные скопления УВ, сформированы в обстановке периодически происходившего тангенциального сжатия. В плане они совпадают с фронтальными частями тектонических чешуй и пологих надвигов в триас-палеозойском комплексе пород, претерпевшем интенсивную складчатость в предъюрское время. Морфология платформенных и доплитных дислокаций резко различна: как правило юрско-меловым антиклиналям в подстилающих отложениях отвечают участки мощного смятия пород лобовых частей тектонических пластин. Этот факт не позволяет использовать структурный план платформенного чехла при определении местоположения скважин, бурящихся на пермотриасовый комплекс и тем более, на палеозойский.

Интенсивная дислоцированность пермотриасовых терригенных отложений во фронтальных

частях тектонических пластин привела к их значительному уплотнению с потерей первоначальных коллекторских свойств. Открытие скоплений нефти и газа в таких зонах маловероятно. Обратная ситуация может наблюдаться в случае присутствия в разрезе мощных карбонатных толщ: их деформация во фронтальных частях тектонических пластин и надвигов сопровождается формированием массивных резервуаров нефти и газа, как это имеет место, например, в триасовых отложениях Южного Мангышлака [25].

Залежи нефти и газа юрско-меловых отложений эпигенетичны вмещающим отложениям и образовались в результате ступенчатой (латерально-вертикальной) миграции из прилегающих с севера к Бузачинскому своду глубоководных зон Прикаспийской синеклизы. Надвиги и мощные зоны принадвигового смятия в доюрских отложениях были серьезными препятствиями на пути латеральных миграционных потоков флюидов Прикаспия, в результате чего скопления нефти и газа были локализованы в ловушках северной части свода, а в более южных его районах они оказались «пустыми». Главным барьером для мигрирующих на юг УВ послужила северная граница Центрально-Мангышлакской раннекиммерийской складчатой зоны, трассирующаяся по линии Каражанбас – Жаманорпа – Кызан.

Основные перспективы обнаружения новых скоплений нефти и газа связаны с северной прибрежной зоной п-ова Бузачи, где продуктивными могут оказаться не только отложения мезозоя, но и палеозоя.

Изложенные в статье результаты могут представлять интерес при решении вопросов формирования скоплений нефти и газа в пределах восточного и южного обрамлений Прикаспийской синеклизы, например, Северный Каспий, кряж Карпинского и другие регионы с развитием складчато-надвиговых дислокаций.

Литература

1. Попков В.И., Калинин М.И., Сейфулин Ш.М. Глубинное строение запада Туранской плиты // Доклады АН СССР. – 1985. – Т. 284. – № 41. – С. 939–943.
2. Хаин В.Е., Богданов Н.А., Попков В.И., Чехович П.А. Тектоника дна Каспийского моря // Геология регионов Каспийского и Аральского морей. Алматы: «КазГЕО». – 2004. – С. 58–78.
3. Хаин В.Е., Попков В.И., Юдин В.В. Палеогеодинамика южного обрамления Восточно-Европейского кратона // Вестник Московского Университета. Серия 4. Геология. – 2010. – № 2. – С. 3–9.
4. Попков В.И., Попков И.В. Структура фундамента Мангышлака и Устьурта по геофизическим данным // Геология. Известия Отделения наук о Земле и природных ресурсов Академии наук республика Башкортостан. – 2020. – № 27. – С. 52–57.
5. Akhmedbeyli F.S., Berlin Yu.M., Bogdanov N.A., Chekhovich P.A., Gadzhiyev A.N., Gassemi M., Guliev I.S., Ismailzadeh A.J., Kengerli T.N., Khain V.Ye., Korobanov V.V., Koronovsky N.V., Kostyuchenko S.L., Levin L.E., Mamedov A.V., Marina M.M., Mirsoev D.A., Odekov O.A., Pilifosov V.M., Pirbudagov V.M., Popkov V.I., Shlygin D.A., Volchegursky L.F., Votsalevsky E.S., Zakhidov A.U. International tectonic map of the Caspian sea region. Scale 1: 2 500 000. – Explanatory Notes. – Moscow : Nauchniy Mir, 2006. – 104 p.
6. Сенин Б.В., Керимов В.Ю., Леончик М.И., Серикова У.С. Углеводородные ресурсы территорий и акваторий Черноморско-Каспийского региона // Минеральные ресурсы России. Экономика и управление. – 2023. – № 1. – С. 16–30.
7. Попков В.И. Тектоника доюрского осадочного комплекса запада Туранской плиты // Геотектоника. – 1986. – № 4. – С. 106–116.

8. Куницына И.В., Дердуга А.В., Никишин А.М., Короткова М.А. Тектоническое строение и история развития палеозойского комплекса Северного Каспия // Геология нефти и газа. – 2020. – № 3. – С. 11–17. DOI:10.31087/0016-7894-2020-3-11-18.
9. Анисимов Л.А. Характер дислокаций в плитном комплексе Скифско-Туранской платформы // Недра Поволжья и Прикаспия. – 2023. – Вып. 109. – С. 30–41. DOI: 10.24412/1997-8316-2023-109-30-41.
10. Куницына И.В., Никишин А.М., Малышев Н.А., Вержбицкий В.Е., Костенко О.В. Тектоностратиграфия и история геологического развития Северо-Каспийской складчато-надвиговой зоны // Вестник Московского университета. Серия 4. Геология. – 2022. – № 5. – С. 35–46. DOI: 10.33623/0579-9406-2022-5-35-46.
11. Попков В.И., Письменная О.В. Геологическое строение и перспективы нефтегазоносности доюрских отложений Каражанбасской антиклинальной зоны и сопредельных территорий. – Актау: Союз научно-инженерных нефтегазовых обществ Казахстана, 1992. – 82 с.
12. Воцалевский Э.С., Шлыгин Д.А. Нефтегазовые системы осадочных бассейнов Казахстанского сектора Каспийского моря // Геология Казахстана. – 2004. – № 3. – С. 330–342.
13. Аммосов И.И., Гречишников Н.П., Горшков В.И., Волкова Т.П. Палеогеотермия и нефтеносность. – М.: Наука, 1982. – 108 с.
14. Пронин А.П., Шестоперова Л.В., Мунара А. Перспективы нефтегазоносности доюрских отложений северного склона Бузачинского поднятия // Нефть и газ. – 2021. – Т. 125. – № 5. – С. 34–45. DOI:10.37878/2708-0080/2021-5.02.
15. Грибков В.В., Калугин А.К., Аристаров М.Г., Беликова А.Р., Тамаров А.И. Перспективы нефтегазоносности доюрских отложений п-ова Бузачи и Северного Устюрта // Геология нефти и газа. – 1981. – № 5. – С. 35–40.
16. Багдасарян Л.Л. Микроорганические остатки в нефтях полуострова Бузачи // Тр. ВНИГРИ. – Вып. 384. – Л.: 1976. – С. 67–71.
17. Виноградова К.В., Цатурова А.А. Палиностратиграфия и палеогеография доюрских отложений Западного Казахстана (п-ов Бузачи) // Палинология в биостратиграфии, палеоэкологии и палеогеографии. Тезисы докладов 8-й Всероссийской палинологической конференции. М., 1996. – С. 28–29.
18. Попков В.И., Рабинович А.А., Досмухамбетова Г.Д. Геологические предпосылки проведения геологоразведочных работ в северной части п-ова Бузачи // Геология нефти и газа. – 1991. – № 2. – С. 2–7.
19. Остроухов С.Б., Крашакова А.В., Бочкарев А.В. Концепция формирования залежей углеводородов Северного Каспия в юрско-меловом комплексе отложений // Геология и разработка месторождений Нижнего Поволжья и Северного Каспия. Труды «ВолгоградНИПИморнефть». Вып. 70. – Волгоград, 2011. – С. 72–87.
20. Куандыков Б.М., Турков О.С., Шестоперова Л.В. Геологическое строение и оценка углеводородного потенциала северо-восточного сегмента Каспийского моря (в пределах Казахстана) // Геология регионов Каспийского и Аральского морей. Алматы: «КазГео», 2004. – С. 224–236.
21. Грибков В.В., Нурманов А.М., Токарев В.П. Грязевые сопки — новый поисковый признак на нефть и газ в Западном Казахстане // Геология нефти и газа. – 1975. – № 1. – С. 21–25.
22. Попков В.И., Попков И.В. Доверхнепермские отложения полуострова Бузачи и перспективы их нефтегазоносности // Вестник Академии наук Республики Башкортостан. – 2021. – Т. 40. – № 3. – С. 5–15. DOI: 10.24412/1728-5283-2021-3-5-15.
23. Попков В.И., Попков И.В. Перспективы обнаружения биогермных построек в доверхнепермских отложениях северной части полуострова Бузачи и прилегающей акватории Каспийского моря // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2021. – Т. 16. – № 2. Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2023.html (дата обращения: 07.12.2023). DOI: 10.17353/2070-5379/11_2021.
24. Ажгалиев Д.К., Коврижных П.Н., Шагиров Б.Б., Каримов С.Г. Особенности строения и развития карбонатов в палеозое южного обрамления Прикаспийского бассейна // Известия УГГУ. – 2018. – Вып. 3. – № 51. – С. 73–82. DOI: 10.21440/2307-2091-2018-3-73-82.
25. Попков В.И., Попков И.В. Ловушки углеводородов в триасовых отложениях Скифско-Туранской платформы в районах развития складчато-надвиговых дислокаций // Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2023. – Т. 18. – № 3. Режим доступа: http://www.ngtp.ru/rub/2023/25_2023.html (дата обращения: 07.12.2023). DOI: 10.17353/2070-5379/25_2023.

References

1. Popkov V.I., Kalinin M.I., Seifulin Sh.M. Glubinnoe stroenie zapada Turanskoi plity [Deep structure of the west of the Turan plate]. *Doklady AN SSSR*. 1985;284(41):939–943. In Russ.
2. Khain V.E., Bogdanov N.A., Popkov V.I., Chekhovich P.A. Tektonika dna Kaspiiskogo morya [Tectonics of the Caspian Sea bottom]. *Geologiya regionov Kaspiiskogo i Aral'skogo morei*. Almaty: "KazGEO"; 2004. pp. 58–78. In Russ.
3. Khain V.E., Popkov V.I., Yudin V.V. Paleogeodinamika yuzhnogo obramleniya Vostochno-Evropeiskogo kratona [Paleogeodynamics of the southern rim of the Eastern European Craton]. *Vestnik Moskovskogo Universiteta. Seriya 4. Geologiya*. 2010;(2):3–9. In Russ.
4. Popkov V.I., Popkov I.V. Struktura fundamenta Mangyshlaka i Ustyurta po geofizicheskim dannym [Basement structure of Mangyshlak and Ustyurt according to geophysical data]. *Geologiya. Izvestiya Otdeleniya nauk o Zemle i prirodnykh resursov Akademii nauk respublika Bashkortostan*. 2020;(27):52–57. In Russ.
5. Akhmedbeyli F.S., Berlin Yu.M., Bogdanov N.A., Chekhovich P.A., Gadkhiyev A.N., Gassemi M., Guliev I.S., Ismailzadeh A.J., Kengerli T.N., Khain V.Ye., Korobanov V.V., Koronovsky N.V., Kostyuchenko S.L., Levin L.E., Mamedov A.V., Marina M.M., Mirsoev D.A., Odekov O.A., Pilifosov V.M., Pirbudagov V.M., Popkov V.I., Shlygin D.A., Volchegursky L.F., Votsalevsky E.S., Zakhidov A.U. International tectonic map of the Caspian sea region. Scale 1: 2 500 000. Explanatory Notes. Moscow: Nauchnyy Mir; 2006. 104 p.
6. Senin B.V., Kerimov V.Yu., Leonchik M.I., Serikova U.S. Onshore and offshore hydrocarbon resources of the Black sea-Caspian region. *Mineral'nye resursy Rossii. Ekonomika i upravlenie*. 2023;(1):16–30. In Russ.

7. Popkov V.I. Tektonika doyurskogo osadochnogo kompleksa zapada Turanskoj plity [Tectonics of the Pre-Jurassic Sedimentary Complex of the West of the Turan Plate]. *Geotektonika*. 1986;(4):106–116. In Russ.
8. Kunitsyna I.V., Derduga A.V., Nikishin A.M., Korotkova M.A. Tectonic framework and history of Palaeozoic series evolution in Northern Caspian. *Geologiya nefi i gaza*. 2020;(3):11–18. DOI: 10.31087/0016-7894-2020-3-11-18. In Russ.
9. Anisimov L.A. The nature of dislocations in the elite complex the Scythian-Turanian platform. *Nedra Povolzh'ya i Prikaspiya*. 2023;(109):30–41. DOI: 10.24412/1997-8316-2023-109-30-41. In Russ.
10. Kunitsyna I.V., Nikishin A.M., Malyshev N.A., Verzhbitskii V.E., Kostenko O.V. Tektonostratigrafiya i istoriya geologicheskogo razvitiya Severo-Kaspiiskoi skladchato-nadvigovoi zony [Tectonostratigraphy and history of the North Caspian fold-thrust zone geological development]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 4. Geologiya*. 2022;(5):35–46. DOI: 10.33623/0579-9406-2022-5-35-46. In Russ.
11. Popkov V.I., Pis'mennaya O.V. Geologicheskoe stroenie i perspektivy neftegazonosnosti doyurskikh otlozhenii Karazhanbasskoi antiklinal'noi zony i sopredel'nykh territorii [Geological structure and prospects of oil and gas potential of the Pre-Jurassic deposits of the Karazhanbass anticline zone and adjacent territories]. Aktau: Soyuz nauchno-inzhenernykh neftegazovykh obshchestv Kazakhstana; 1992. 82 p. In Russ.
12. Votsalevskii E.S., Shlygin D.A. Neftegazovye sistemy osadochnykh basseinov Kazakhstanskogo sektora Kaspiiskogo morya [Oil and gas systems of sedimentary basins of the Caspian Sea Kazakh sector]. *Geologiya Kazakhstana*. 2004;(3):330–342. In Russ.
13. Ammosov I.I., Grechishnikov N.P., Gorshkov V.I., Volkova T.P. Paleogeotermya i neftenosnost' [Paleogeothermy and oil content]. Moscow: Nauka; 1982. 108 p. In Russ.
14. Pronin A.P., Shestoperova L.V., Munara A.M. Oil-and-gas potential of the pre-Jurassic deposits of the Northern slope of the Buzachinsky uplift. *Neft' i gaz*. 2021;(5):34–45. DOI: 10.37878/2708-0080/2021-5.02. In Russ.
15. Gribkov V.V., Kalugin A.K., Aristarov M.G., Belikova A.R., Tamarov A.I. Petroleum prospects of Prejurassic sediments on Buzachi Peninsula and in North Ustyurt. *Geologiya nefi i gaza*. 1981;(5):35–40. In Russ.
16. Bagdasaryan L.L. Mikroorganicheskie ostatki v neftnykh poluostrova Buzachi [Microorganic residues in the oils of the Buzachi Peninsula]. Tr. VNIGRI. Issue 384. Leningrad; 1976. pp. 67–71. In Russ.
17. Vinogradova K.V., Tsaturova A.A. Palinostratigrafiya i paleogeografiya doyurskikh otlozhenii Zapadnogo Kazakhstana (p-ov Buzachi) [Palinostratigraphy and paleogeography of the Pre-Jurassic deposits of Western Kazakhstan (Buzachi peninsula)]. *Palinologiya v biostratigrafii, paleoekologii i paleogeografii. Tezisy dokladov 8-i Vserossiiskoi palinologicheskoi konferentsii*. Moscow, 1996. pp. 28–29. In Russ.
18. Popkov V.I., Rabinovich A.A., Dismukhambetova G.D. Geological premises for carrying out exploration in the northern part of the Buzachi Peninsula. *Geologiya nefi i gaza*. 1991;(2):2–7. In Russ.
19. Ostroukhov S.B., Krashakova A.V., Bochkarev A.V. Kontseptsiya formirovaniya zalezhei uglevodorodov Severnogo Kaspiya v yursko-melovom komplekse otlozhenii [The concept of formation of the Northern Caspian Sea hydrocarbon deposits in the Jurassic-Cretaceous complex of sediments]. *Geologiya i razrabotka mestorozhdenii Nizhnego Povolzh'ya i Severnogo Kaspiya. Trudy «VolgogradNIPImorneft'»*. Issue 70. Volgograd; 2011. pp. 72–87. In Russ.
20. Kuandykov B.M., Turkov O.S., Shestoperova L.V. Geologicheskoe stroenie i otsenka uglevodorodnogo potentsiala severo-vostochnogo segmenta Kaspiiskogo morya (v predelakh Kazakhstana) [Geological structure and assessment of the hydrocarbon potential of the Caspian Sea northeastern segment (within Kazakhstan)]. *Geologiya regionov Kaspiiskogo i Aral'skogo morei*. Almaty: "KazGeo"; 2004. pp. 224–236. In Russ.
21. Gribkov V.V., Nurmanov A.M., Tokarev V.P. Gryazevye sopki — novyi poiskovy priznak na nefi' i gaz v Zapadnom Kazakhstane [Mud hills are a new search sign for oil and gas in Western Kazakhstan]. *Geologiya nefi i gaza*. 1975;(1):21–25. In Russ.
22. Popkov V.I., Popkov I.V. Pre-upper Permian deposits of the Buzachi peninsula and the prospects for their oil and gas potential. *Vestnik Akademii nauk Respubliki Bashkortostan*. 2021;40(3):5–15. DOI:10.24412/1728-5283-2021-3-5-15. In Russ.
23. Popkov V.I., Popkov I.V. Perspektivy obnaruzheniya biogermnykh postroek v doverkhnepermiskikh otlozheniyakh severnoy chasti poluostrova Buzachi i prilgayushchey akvatorii Kaspiyskogo morya [Biohermal structures exploration of the Pre Upper Permian sedimentary rocks of the northern part of the Buzachi Peninsula and the neighbouring shelf area of the Caspian Sea]. *Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika*. 2021;16(2). Available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2023.html (accessed 07.12.2023). DOI: 10.17353/2070-5379/11_2021. In Russ.
24. Azhgaliev D.K., Kovrizhnykh P.N., Shagirov B.B., Karimov S.G. Structural features of carbonates and their development in the Paleozoic in the south margins of the Pre-Caspian basin. *Izvestiya UGGU*. 2018;3(51):73–82. DOI: 10.21440/2307-2091-2018-3-73-82. In Russ.
25. Popkov V.I., Popkov I.V. Lovushki uglevodorodov v triasovykh otlozheniyakh Skifsko-Turanskoj platformy v rayonakh razvitiya skladchato-nadvigovykh dislokatsiy [Hydrocarbon traps in triassic sedimentary rocks of the Scythian-Turan platform in the areas of development of fold-thrust dislocations]. *Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika*. 2023;18(3). Available at: http://www.ngtp.ru/rub/2023/25_2023.html (accessed: 07.12.2023). In Russ. DOI: 10.17353/2070-5379/25_2023.

Информация об авторах**Попков Василий Иванович**

Доктор геолого-минералогических наук,
профессор
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
350040 Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149
e-mail: geoskubsu@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-2959-4901
Scopus ID: 22986475600
SPIN: 95384943

Попков Иван Васильевич

Кандидат геолого-минералогических наук,
доцент
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет»,
350040 Краснодар, ул. Ставропольская, д. 149
e-mail: iv-popkov@mail.ru
ORCID: 0000-0002-2386-661
Scopus ID: 56017130100
SPIN: 10137013

Information about authors**Vasily I. Popkov**

Doctor of Geological and Mineralogical Sciences,
Professor
Kuban State University,
149, ul. Stavropolskaya, Krasnodar, 350040, Russia
e-mail: geoskubsu@mail.ru
ORCID ID: 0000-0002-2959-4901
Scopus ID: 22986475600
SPIN: 95384943

Ivan V. Popkov

Candidate of geological and mineralogical sciences,
Assistant professor
Kuban State University,
149, ul. Stavropolskaya, Krasnodar, 350040, Russia
e-mail: iv-popkov@mail.ru
ORCID: 0000-0002-2386-661
Scopus ID: 56017130100
SPIN: 10137013